N° 87.

1.

# Observation sur l'opération d'un Bubonocêle,

par M. Buanoy chir. à Vallon en vivarais près le pont St. Esprit.

Le 13 aout dernier j'ai fait l'opération du Bubonocêle a la femme d'un hab.t de Montpezat agée d'environ 40 ans. La tumeur qui etoit a l'aine droite avait la grosseur d'un oeuf. Les simptomes de l'etranglement se faisoient sentir depuis le 7 dud. ce qui faisait le 6.me jour où la femme etoit dans un etat affreux; les coliques, le vomissement presque continuels, du moins a la moindre cueillerée de boisson ou de bouillon qu'elle prenoit, une anxieté & un mal-aise considerable joint a une difficulté de respirer, faisoient avec juste raison craindre pour les jours de cette femme. Arrivé dans cette ville & il me falut deux jours en comptant la journée de l'exprés, a cause de l'eloignement, je rencontrai le chirurg. ord.re qui me dit que j'etois venu trop tard, que la femme etoit dans la derniere extremité, je repondis que je le croyois comme lui, vû que l'etranglement & les simptomes se faisoient sentir depuis 6 jours, a moins toute fois que la hernie ne fut epiplocêle ou entero-epiplocêle. Arrivé auprès de cette femme(a) je changeai d'avis attendu que le ventre n'etoit point tendu ~~...~~ & peu douloureux, son pouls etoit frequent & petit, mais avait de la consistence, son visage n'anoncoit rien de bien dangereux & les extremités n'etoient point froides. Sans aucun délai je fis l'opération dés aussitot être arrivé; aprés l'ouverture du sac duquel il sortit un peu d'eau roussatre j'apperçus une tumeur ronde de couleur violette tirant sur le noir ayant pourtant un peu de consistence & de fermeté, que je pris avec raison pour l'intestin puisque la sortie de l'eau m'avoit suffisemment prouvé que j'etois dans le sac: ~~cependant en parcourant la surface de cette tumeur:~~ Cependant en parcourant la surface de cette tumeur, je n'apperçus aucune

(a) et l'examen de son etat fait

ARC 15 d. 83

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

aucune Ramification des Vaisseaux Mesenteriques qui doivent y ramper, aucune trace non plus d'Epiploon, ce qui me surprit de ce que l'intestin si c'Etait veritablement lui, ce fut conservé si long-tems Etranglé seul; En faisant attention a la racine de la tumeur qui devoit sortir de l'anneau je la trouvai tellement adhérante circulairement qu'elle faisoit un même Corps avec le cercle de l'anneau ne pouvant penetrer d'aucun coté pour le débrider: comme je n'avois personne avec qui je pouvois conférer pour m'Eclairer par le raisonnement; je fus je l'avoue dans la plus grande peine & dans le plus grand doute si c'Etoit veritablement l'intestin, ou bien un second sac que je devois percer pour découvrir les parties contenuës. je passai un quart d'heure dans la plus grande perplexité, desirant le sort d'un chirurgien de ville qui dans des cas semblables Est toujours assisté d'un ou de plusieurs confreres capables, au Lieu que je n'Etois Entouré que de paisans grossiers & d'un chirurgien ~~grossier~~ qui pouvait a peine distinguer sa droite de sa gauche: il est bien vray que j'avois de fortes raisons pour Croire que c'Etoit l'intestin, que ~~[illegible]~~ si les ramifications Mesenteriques ne s'appercevoient point, cella provenoit de ce que l'Engorgement Excessif des Vaisseaux blancs & des Vaisseaux rouges Etoit parvenu au point qui confondoit tout, que l'issuë de l'eau m'annonçoit ou devôit m'annoncer que j'Etois dans le sac &c.. tout cella auroit sans doute suffit pour un chirurg plus instruit & plus hardy que moi, Mais je l'avouë Malgré toutes ces fortes Raisons je fus presque sur le point de percer cette pretenduë tumeur, ce qui aurait-été une faute des plus graves qu'un chirurgien puisse jamais comettre. cependant comme je suis heureusement dans l'usage d'Etre fort lent dans mes Expeditions en pareil cas afin de me donner le tems necessaire a la Reflexion; dans ces Moments precieux je raisonnai, je Reflechis, je tatonai doucement cette tumeur pour me rendre a moi-même l'indication d'agir claire & Manifeste; je suis naturellement tres Méfiant de Moi-même c'Est asses mon panchant depuis que je me

me couvrir; Mais surtout je suis singulierement en garde
Contre les fautes dont je suis capables, depuis une operation d'une
hernie Ombilicale avec gangrene, que je fis il y a environ 8 a 9 ans
En présence de deux Médecins l'un desquels étoit un vieux praticien
a qui une longue pratique & une sorte de réputation lui donnoit
un droit a la direction d'un jeune-homme tel que j'etois pour lors,
n'ayant encor que vû travaillé a l'hotel dieu de paris, mais presque
jamais travaillé moi-même, du moins pour des opérations si délicates,
d'ailleurs ayant, comme je l'ai dit, une confiance un peu trop modérée
en moi-même, notre vieux médecin eut tout l'empire qu'il desiroit;
Et après l'ouverture de cette tumeur Ombilicale, les choses étant un peu
Embrouillées & ne pouvant bien demeler les parties entre-elles, y ayant une
grande quantité d'Epiploon, il m'ordonnat avec toute la sureté d'un
grand Opérateur, qu'il falait couper une bride qui tenoit disoit-il les
parties en respect, & qu'après sa section tout se développeroit: je la
Coupai en effet, mais cette pretendue bride se trouva être l'intestin
lui même qui alloit d'un coin d'une playe a l'autre, ~~tout~~ masqué & caché
par l'Epiploon & l'engorgement extraord.re de toutes les parties environant,
heureusement que l'On le vit en gangrené & pourri, ce qui me consola
un peu de mon aveugle complaisance; La femme mourut quelques
jours après. Depuis que j'ai fait nombre de fois cette Opération avec
un brillant succé, je me rappelle que souvent l'Etat de l'intestin avait
beaucoup d'analogie avec celui de cette femme; je crois même en avoir
instruit l'academie dans le courant de cette année. Dans le cas de
cette femme j'aurais du, après la section de l'intestin hazardée mal
apropos par ma timide & condamnable complaisance, ainsi que par
la téméraire hardiesse de ce vieux Medecin, emporter tout ce qui se
trouvait gangrené, ~~jamais~~ ~~de~~ tenter la réunion des deux bouts sains
par l'une des methodes déja mise en usage avec succé, mais notre

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

vieux Médecin étoit le directeur, & moi peu consommé dans le manuel d'operations aussi importantes. je devins l'acteur de l'operation qui fait le sujet de l'observation présente. L'examen de cette tumeur, le raisonnement & la réflexion me conduisirent à penser que la tumeur étoit assez grosse pour que la totalité du diamètre de l'intestin fut engagée quoiqu'elle ne fût point d'assez en dehors, qu'en conséquence en soulevant la tumeur & lui faisant faire avec prudence la bascule, je pourrais parvenir à la décoler de l'anneau & me rendre clair le Mésentère si c'étoit véritablement l'intestin(a) ce qui me réussit, mon petit procédé fut à peine réitéré deux ou trois fois, que la tumeur se décolat d'un coin de la circonférence de l'anneau, & me laissat appercevoir un peu du Mézentère qui se faisoit reconnoître par une quantité de Ramifications en Rayons, & par des petits plis en forme de Manchettes, de même que par sa couleur différente de celle de l'intestin celui ci étant d'un violet foncé, tandis que le Mézentère étoit d'un rouge animé & naturel ainsi que la petite portion d'intestin qui se dévelopat en même tems. cette découverte me causa la plus grande joye, de voir tous mes doutes dissipés, & l'indication d'agir clair & manifeste;
je conçus pour lors la plus grande espérance de succès quoique le boyau tirat sur le noir, parce qu'il avoit la consistence & la fermeté de ceux dans lesquels car j'avois si bien réussi. Pour finir l'operation je débridai l'anneau en partie avec le bistouri caché & en partie avec le bistouri droit, m'étant servi nombre de fois du premier avec le plus grand succès. L'incision de l'anneau me donna beaucoup de peine à cause d'une quantité de glandes & de graisse qui étoient antérieures & qui rendoient le cercle de l'anneau caché & profond. Mais les emportai avec les pinces & les ciseaux, & l'anneau étant à découvert je le débridai avec la plus grande aisance; Cella fait je tirai une

(a) qui formé la tumeur.

une partie de l'intestin sain qui étoit dans le ventre afin d'avoir plus d'aisance de Réduire le tout, ~~afe~~, en faisant passer une partie des vents de l'intestin malade dans celui qui étoit sain, & diminuer par là d'autant le volume, car il n'y avoit absolument que des vents dans la portion Etranglée, mais point de Matières stercorales. Le taxis s'opera ensuite très facilement en pressant la tumeur par le Moyen de petits mouvements en rond dirigés vers les os des iles. L'intestin avoit été tellement Etranglé dans ses deux diamettres pris par l'anneau qu'ils avoient diminué de telle sorte qu'ils paroissoient a peine dans cet endroit de la grosseur d'une grosse plume a Ecrire. L'operation finie je me mis en devoir de faire le pansement, & a proportion que je placois le charpie pour Matelasser mollement la playe, je voyois l'appareil être teint de sang; je pensois que c'étoit quelque petites Ramification comme cella arrive dans toutes les grandes Operations; ainsi je n'la fis pas cas je continuai Mon pansement, & appliquai mon Bandage, cella fait je donnai mes soins a la Malade qui se trouvoit être, dans tout le corps, dans une Espece de Spasme convulsif, mais cella se dissipa peu de tems apres. Un quart d'heure apres l'operation la malade me dit qu'elle se sentoit toute Mouillée, je voulus l'Examiner & trouvai en effet que le sang devoit avoir coulé abondamment puisqu'il y avoit des caillots entre les cuisses de la Malade. je defis l'appareil, portai un Morceau d'agaric lié bien avant dans l'anneau, & m'assurant qu'il étoit dessus les vaisseaux j'y plaçai un autre Morceau, & garnis ~~le~~ les environs de Bourdonnets & de compresses, le tout faisant une petite proéminence au dessus du Niveau de la peau, et le Bandage appliqué je mis une personne a coté de la Malade, qui faisoit avec la Main une douce pression qui fut continuée pendant deux heures ayant soin d'y donner un coup d'œil de tems en tems; car de la force que le sang avoit coulé

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

je crû que je serois obligé de faire la ligature du vaisseau; cependant il ne fut plus question d'hémorragie. La Malade fut saignée demy-heure après l'opération, & comme le vomissement & les autres symptomes calmerent elle ne fut pas résaignée. je lui fis donner une cueillerée d'huile d'amande douce d'heure en heure en commençant immediatement après la saignée; C'est assez mon usage dans ces opérations, je continüe l'huile jusqu'à-ce que le ventre commence a s'ouvrir, cela arrive plutôt ou plus tard, mais ord.^t 4 a 5 cueillerée operent cet effet;
C'est un moyen dont je me trouve admirablement bien, il calme les spasmes suite des irritations & des souffrances, & ouvre le ventre au tems qu'il faut pour débarrasser & alléger le canal intestinal, & n'a point l'inconvenient d'un purgatif agaçant. chez cette malade le ventre s'ouvrit vers les 5 a 6 heures du soir & l'operation avoit été faite a deux de l'apres Midy; elle fut plus de dix selles cette nuit là, la douleur & la tension du ventre diminuerent a vüe d'oeil ainsi que la difficulté de respirer, mais la frequence du pouls se soutenoit, je lui fis donner le landemain une prise d'Emito-coston, elle fit 3 gros vers par les selles, Le Chirurgien du lieu m'assura qu'elle en avoit rendu par la bouche dans les 6 jours de l'Etranglement Environ 60. il est inoüi combien les païsans de ces Montagnes rendent des vers par la bouche & par le fondement; j'ai pensé qu'ils etoient produits par les chataignes & les pommes de terre dont ces païsans faisoient leur principale nourriture; Mais heureusement le Grand secret de l'Emitocorton est connû dans le païs. La Malade ayant passé les 3 nuits qui suivirent l'opération sans dormir, la quatrieme je lui fis donner une cueillerée a bouche de sirop de pavot blanc qui produisit un tres bon effet. je pansai la Malade pour la premiere fois le 5 jour de l'operation, tout etoit en tres bon etat, les morceaux d'amadou & de charpi vinrent sans violence, une douce

suppuration par dessous les avoit detaché; Et l'on ne devroit jamais lever un pareil gâteau que lorsque la suppuration est Etablie, cependant j'ai vû pratiquer le contraire par des Chirurgiens de Réputation, quoiqu'il n'y eut aucun cas urgent qui en nécessitat la levée avant ce moment.
La Malade Etant parfaitement bien je partis le lendemain Récommandant au Chirurgien & lui traçant la ~~attention~~ conduite qu'il y avoit à tenir, & qu'au cas qu'elle eut besoin d'être purgée, elle le fut avec l'huile d'amande douce, donnée comme nous l'avons dit par cuillerée de distance ~~en~~ en distance jusqu'à l'Effet desiré:
Cette méthode douce & analogue ~~...~~ à la circonstance, seroit bien appliquable aux maladies inflammatoires & nerveuses dans lesquelles on Craint les purgatifs irritants.—
Quoique cette observation ne presente absolument rien de nouveau. Cependant il m'a paru qu'elle renfermoit quelques circonstances dignes d'attention pour les jeunes praticiens. C'est que d'abord l'on ne doit pas toujours s'attendre à voir réunis tous les signes qui distinguent & caracterisent la nature de la tumeur Enterocèle dans un cas mortifique; alors la patience & la prudence sont les seuls sécours capables de manifester l'indication d'agir de telle ou telle maniere. En vain auroit-on desiré dans cette tumeur Enterocèle d'y voir les ramifications des vaisseaux mesenteriques qui doivent ramper circulairement sur l'intestin;
De plus L'on a vû que son adhérance intime autour de l'anneau donnoit avec raison des doutes & des inquietudes; car dans le fond par où Entrer pour débrider l'anneau? Et pourquoi cette tumeur separée du sac & isolée par l'intermede de l'eau, ne l'Etoit-elle point du cercle de l'anneau par la même cause, C'est-à-dire par la présence de L'eau qui devoit humecter en s'insinuant Entre le cercle de l'anneau & la tumeur Entero-cele; C'est du moins ce que j'ai vû dans les autres

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

opération de Cette Nature que j'ai fait. je peut bien qu'on me répondra que L'issüe de l'eau devoit me servir de règle sûre que j'étois dans le sac, Mais ne pouvoit-il pas se trouver un second sac. Enfin quelque singularité comme il s'en trouve tant dans les opérations. Si j'avois Malheureusement eû mon vieux Medécin pour conseil j'aurois vraissemblablement ouvert cette tumeur & par conséquent l'intestin, comme je fis dans la hernie ombilicale citée plus haut. L'on a vû ~~par~~ L'esprit que ce qui m'a le Mieux réüssit a été de pancher la tumeur d'un coté en lui faisant faire une bosse, cette que par ce Moyen les adhérances circulaires se sont déchirées & m'ont laissé entrevoir les ramifications des Vaisseaux Mézenteriques, une Couleur Animée des parties non Etranglées, des petites rides ou plis du Mezentere &c. Ce qui m'a convaincu que la tumeur étoit formée par l'intestin & qu'il n'y avoit plus de sac a ouvrir. je me suis felicité de Mon attente & de ma patiente perquisition.

Une autre circonstance que renferme Cette observation & qui me paroit digne de remarque, C'est que l'intestin s'est conservé 6 jours entiers étranglé sans se gangrener, quoique la hernie fut Enterocele & les trois quart du Diamettre pincé & tres pincé puisqu'il y avoit une adhérance autour de l'anneau. Cella ne peut qu'ajouter aux faits de Même Nature qui ont servi & qui servent d'Encouragement aux Chirurgiens qui sont appellés tard pour de semblables opérations.